



Datos importantes sobre el cáncer cervical & VPH

- El cáncer cervical se puede prevenir si se hace un examen de detección con regularidad.
- En la mayoría de los casos el cáncer cervical es causado por un virus común llamado Virus del Papiloma Humano (VPH).
- La mayoría de las mujeres tendrán el VPH en algún momento de sus vidas pero pocas desarrollarán cáncer cervical.
- Sólo si la infección por el VPH persiste por varios años puede poner a la mujer en riesgo de desarrollar cáncer cervical.
- El examen para detectar el cáncer cervical lo puede hacer su médico mediante la prueba de Papanicolaou, si usted tiene menos de 30 años de edad, o mediante la prueba de Papanicolaou y una prueba para detectar el VPH, si tiene 30 años de edad o más.
- La prueba de Papanicolaou busca cambios en las células del cervix, o el cuello del útero, que pueden conducir a la aparición del cáncer.
- La prueba del VPH busca el virus que causa el cáncer cervical.
- Si el Papanicolaou y la prueba del VPH se usan juntos en mujeres de 30 años de edad o más, se puede identificar mejor a quienes necesitan intervención temprana para prevenir el cáncer cervical.
- Cada mujer debe preguntar a su médico para saber cuál es la prueba de detección más adecuada a su caso.
- Además, en la actualidad está disponible una vacuna contra el VPH para niñas y jóvenes de 9 a 26 años de edad. Aunque la vacuna ayudará a prevenir muchas infecciones del VPH, los exámenes de detección aun serán necesarios para prevenir el cáncer cervical.

Llame hoy a su médico para pedir una cita.

<http://www.cluw.org/cervcancer.html>



Coalition of Labor Union Women
815 16th St. NW, 2nd Floor South
Washington, DC 20006
Tel.: 202-508-6901 Fax: 202-508-6968
E-mail: info@cluw.org Website: www.cluw.org

