



Brought to you by

Asian Pacific American Labor Alliance (APALA)

815 16th St., NW, 2nd Floor, Washington, DC 20006

Tel.: (202) 508-3733 E-mail: apala@apalanet.org

Website: www.apalanet.org



有關子宮頸癌和人乳頭狀瘤病毒

的簡明資訊

- 子宮頸癌可透過定期篩檢有效地預防
- 子宮頸癌幾乎總是由一種普通病毒——人乳頭狀瘤病毒（HPV）——引起。
- 大多數婦女在生活中的某個時期都會感染HPV，但很少有人會發展成子宮頸癌。
- 只有在HPV感染持續幾年的情況下才會使婦女面臨患子宮頸癌的風險
- 如果您的年齡在30歲以下，可由您的醫生採用巴氏測試方法進行子宮頸癌篩檢；如果您的年齡在30歲或以上，可採用巴氏測試和HPV測試的方法進行篩檢。
- 巴氏測試查找可能導致癌症的子宮頸內的細胞變化。
- 如果對30歲及以上婦女同時進行巴氏測試和HPV測試，則能夠發現需要接受早期幹預的病變，預防子宮頸癌。
- 婦女應當就最適合自身篩檢需求的測試向自己的健康護理服務提供者洽詢。
- 此外，目前可為年齡在9-26歲之間的女孩和青年婦女進行HPV疫苗注射。儘管該疫苗能夠幫助預防多種HPV感染，仍然有必要接受篩檢，預防子宮頸癌。

請今天就打電話給您的健康護理服務提供者約診

<http://www.cluw.org/cervcancer.html>



Coalition of Labor Union Women

815 16th St. NW, 2nd Floor South
Washington, DC20006

Tel.: 202-508-6901

Fax: 202-508-6968

E-mail: info@cluw.org

Website: www.cluw.org

