



Faits en bref sur

le cancer du col de l'utérus et le virus du papillome humain

- Le cancer du col de l'utérus est très évitable par des tests de dépistage à intervalles réguliers.
- Un virus courant, le virus du papillome humain (HPV), est presque toujours à l'origine du développement d'un cancer du col de l'utérus.
- La plupart des femmes contracteront le virus du papillome humain tôt ou tard dans leur vie, mais peu ne développeront un cancer du col de l'utérus.
- Les femmes atteintes d'une infection par le virus du papillome humain qui persiste pendant plusieurs années sont à risque de développer un cancer du col de l'utérus.
- Votre médecin peut procéder à des tests de dépistage du cancer du col de l'utérus. Si vous êtes âgée de moins de 30 ans, un test de Papanicolaou suffit; si vous êtes âgée de 30 ans ou plus, ce test sera combiné à un test de dépistage du virus du papillome humain.
- Un test de Papanicolaou sert à dépister les mutations cellulaires dans le col de l'utérus pouvant mener au développement d'un cancer.
- Le test de dépistage du virus du papillome humain permet de dépister le virus qui cause le cancer du col de l'utérus.
- Lorsqu'ils sont combinés dans le cas de femmes âgées de 30 ans ou plus, les tests de Papanicolaou et de dépistage du virus du papillome humain sont plus efficaces pour dépister les femmes nécessitant une intervention immédiate pour prévenir le développement d'un cancer du col de l'utérus.
- Les femmes devraient demander à leur prestataire de soins de santé de subir le test le mieux adapté à leurs besoins en matière de dépistage.

Téléphonez à votre prestataire de soins de santé dès aujourd'hui pour prendre rendez-vous.

<http://www.cluw.org/cervcancer.html>



Coalition des femmes syndiquées
815 16th St., NW, 2nd Floor
Washington, DC 20006
Tél.: (202) 508-6969 Téléc.: (202) 508-6968
Courriel: info@cluw.org Site Internet: www.cluw.org

